

INDICACIONES DE VACUNACIÓN FRENTE A HERPES ZÓSTER EN ANDALUCÍA 2025

VACUNACIÓN SISTEMÁTICA

	PAUTA	COMENTARIOS
PERSONAS DE 65 Y 66 AÑOS (NACIDAS EN 1960 Y 1959)	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> A PARTIR DEL 01 MARZO 2025

VACUNACIÓN EN PERSONAS DE 18 AÑOS O MÁS CON CONDICIONES DE RIESGO

	PAUTA	COMENTARIOS
RECEPTORES DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> RECEPTORES DE TRASPLANTE ALOGÉNICO: A PARTIR DE 6 MESES POSTRASPLANTE RECEPTORES DE TRASPLANTE AUTÓLOGO: A PARTIR DE LOS 3 MESES POSTRASPLANTE. SE PUEDE CONSIDERAR A PARTIR DE 2 MESES
RECEPTORES DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO O EN ESPERA DEL MISMO	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> SI VACUNACIÓN PRETRASPLANTE: IDEALMENTE COMPLETAR PAUTA AL MENOS 2 SEMANAS ANTES DEL TOS (PREFERIBLEMENTE 4 SEMANAS ANTES) SI VACUNACIÓN POSTRASPLANTE: A PARTIR DE LOS 4 MESES POSTRASPLANTE, PREFERIBLEMENTE CON TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR A DOSIS DE MANTENIMIENTO Y EN UN MOMENTO DE FUNCIÓN ESTABLE DEL INJERTO (SIN RECHAZO RECIENTE)
HEMOPATÍAS MALIGNAS , COMO LEUCEMIAS, LINFOMAS O TRASTORNOS LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRAR PRIMERA DOSIS AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE INICIAR EL PRIMER CICLO DE QUIMIOTERAPIA O CUALQUIER TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR SI NO ES POSIBLE, BUSCAR PERÍODOS VENTANA DE MENOR INMUNOSUPRESIÓN Y ESTABILIDAD
TUMORES SÓLIDOS EN TRATAMIENTO ACTIVO CON QUIMIOTERAPIA O QUE HAYAN RECIBIDO QUIMIOTERAPIA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRAR PRIMERA DOSIS AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO ANTITUMORAL SI NO ES POSIBLE, BUSCAR PERÍODOS VENTANA DE MENOR INMUNOSUPRESIÓN Y ESTABILIDAD
TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTI-JAK	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRAR EN CUALQUIER MOMENTO ANTES O DURANTE EL TRATAMIENTO SE RECOMIENDA COMPLETAR PAUTA AL MENOS 2 SEMANAS ANTES DEL INICIO DEL TRATAMIENTO CON ANTI-JAK (PREFERIBLEMENTE 4 SEMANAS ANTES)
TRATAMIENTO CON OTROS FÁRMACOS INMUNOMODULADORES O INMUNOSUPRESORES	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRAR EN CUALQUIER MOMENTO ANTES O DURANTE EL TRATAMIENTO SE RECOMIENDA COMPLETAR PAUTA AL MENOS 2 SEMANAS ANTES DEL INICIO DEL TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR O INMUNOSUPRESOR (PREFERIBLEMENTE 4 SEMANAS ANTES)
INFECCIÓN POR VIH	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> SI CD4 ≥200/ML: NO ESPERAR NINGÚN PERIODO DE TIEMPO PARA LA VACUNACIÓN SI CD4 <200/ML: VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN. PACIENTES CON DIAGNÓSTICO EN ESTADIO PRECOZ Y TRAS INICIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL, ESPERAR INCREMENTO DE CD4 EN PRIMEROS 3 MESES PARA INICIO DE VACUNACIÓN. NO DEMORAR VACUNACIÓN SI VIH AVANZADO/SIDA
HERPES ZÓSTER RECURRENTE (AL MENOS 2 EPISODIOS)	2 DOSIS SEPARADAS POR AL MENOS 2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> ADMINISTRAR PRIMERA DOSIS AL MENOS 6 MESES DESPUÉS DEL ÚLTIMO EPISODIO EN PACIENTES CON INMUNOSUPRESIÓN, INICIAR LA PAUTA TRAS LA RECUPERACIÓN DEL EPISODIO

Más información: <https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/herpes-zoster/>
Fecha de actualización: 1 de marzo de 2025

